



Bábolna LG

TAKAMÁNYKEVERÉK SZOPTATÓ KANCÁK VALAMINT CSIKÓK RÉSZÉRE

A szoptatós kanca takarmányozásánál fontos, hogy a megfelelően koncentrált abraktakarmánnyal minél jobban megközelítsük a kanca táplálóanyag szükségletét, és megakadályozzuk a kanca testtömeg vesztesét, mely korai embrióelhalást eredményezhet (legtöbbször a kancák újravemhesítése ebben az időszakban történik).

A csikók takarmányozása során rendkívül fontos, hogy a túlzott/aránytalan energiabevitelt megakadályozzuk, mivel a jóindulatú „hízalás” mozgásszervi betegségek kialakulásához vezet. Az energiabevitel mellett ezért a makro-, mikroelemeket, vitaminokat, aminosavakat és fehérjét az energiával arányosan kell biztosítani, melyre a **BÁBOLNA LG** takarmány a legalkalmasabb.

Táplálóanyag tartalom:

DE ló	12,30	MJ/kg	C vitamin	250,00	mg/kg
Nyersfehérje	15,75	%	A vitamin	25 000,00	NE/kg
Nyerszsír	3,40	%	D ₃ vitamin	3 000,00	NE/kg
Nyersrost	8,50	%	E vitamin	250,00	mg/kg
Lizin	0,90	%	Mangán	200,00	mg/kg
Kalcium	1,05	%	Cink	300,00	mg/kg
Foszfor	0,60	%	Vas	200,00	mg/kg
Nátrium	0,16	%	Réz	120,00	mg/kg
Nyers hamu	6,70	%	Szelén	0,60	mg/kg

Felhasználási javaslat: A laktáció szakaszának, kondíció függvényében szoptatós kancák részére 3-9 kg/nap/állat (600 kg-os testtömeg mellett), illetve szopós csikók, csikók takarmányozására 18 hónapos korig, 0,5-1,5 kg/100 kg testtömeg adagban.

A **BÁBOLNA LG** az anyagcsere-folyamatokra kedvező hatású omega-3 zsírsavakban gazdag lenolajat, emelt mennyiségű biotint és mikroelemeket, és szerves kötésű mikroelemeket tartalmaz a jobb egészségügyi állapot és a nagyobb ételteljesítmény elérése érdekében.